





Prélèvement d'urine à mi-jet

En quoi consiste ce prélèvement ?





Un prélèvement d'urine "propre" à mi-jet est couramment utilisé pour rechercher des signes d'infection urinaire ou pour d'autres tests diagnostiques. Il permet d'obtenir un échantillon plus représentatif de l'urine, qui est moins susceptible de contenir des contaminants extérieurs.

Comment effectuer la collecte d'urine mi-jet ?






➤ Femmes

<ol style="list-style-type: none">1. Lavez-vous les mains à l'eau et au savon pendant 30 secondes.2. Imbibez la compresse avec l'Hibidil.3. Gardez la compresse dans son emballage.	
<ol style="list-style-type: none">4. Enlevez le couvercle du pot à urine.5. Déposez-le à l'envers sur une surface plane.6. Évitez de toucher l'intérieur du pot et du couvercle.	
<ol style="list-style-type: none">7. Désinfectez-vous les mains à l'aide de la solution hydro-alcoolique mise à votre disposition.8. Installez-vous, jambes écartées, au-dessus de la toilette.9. Séparez les plis de la vulve avec une main pour exposer le méat urinaire (l'orifice par lequel les femmes urinent, situé entre le clitoris et l'ouverture du vagin).	
<ol style="list-style-type: none">10. Avec la compresse imbibée, nettoyez le méat urinaire de l'avant vers l'arrière et de l'intérieur vers l'extérieur.11. Terminez par le nettoyage du reste de la vulve	




Siège social - Maatschappelijke zetel
38 Rue Baron Lambertstraat - 1040 Bruxelles / Brussel

<p>12. Laissez couler les premières gouttes d'urine dans les toilettes.</p>	
<p>13. Remplissez la moitié du pot sans toucher le jet.</p> <p>14. Évitez de toucher l'intérieur du pot.</p>	
<p>15. Terminez d'uriner dans les toilettes.</p>	
<p>16. Refermez le pot de façon bien étanche.</p> <p>17. Lavez-vous les mains à l'eau et au savon pendant 30 secondes.</p> <p>18. Apportez l'échantillon au centre de prélèvement ou au soignant qui vous l'a demandé.</p>	

➤ **Hommes**

<p>1. Lavez-vous les mains à l'eau et au savon pendant 30 secondes. 2. Imbibez la compresse avec l'Hibidil. 3. Gardez la compresse dans son emballage.</p>	
<p>4. Enlevez le couvercle du pot à urine. 5. Déposez-le à l'envers sur une surface plane. 6. Évitez de toucher l'intérieur du pot et du couvercle.</p>	
<p>7. Désinfectez-vous les mains à l'aide de la solution hydro-alcoolique mise à votre disposition. 8. Homme non circoncis : découvrez le gland en tirant sur le prépuce pour dégager le méat urinaire.</p>	
<p>9. Avec la compresse imbibée, nettoyez le gland en partant du méat urinaire vers la base du gland.</p>	
<p>10. Laissez couler les premières gouttes d'urine dans les toilettes.</p>	

Siège social - Maatschappelijke zetel
38 Rue Baron Lambertstraat - 1040 Bruxelles / Brussel

<p>11. Tenez le pot en gardant les doigts à l'extérieur.</p> <p>12. Remplissez la moitié du pot sans toucher le jet.</p>	
<p>13. Terminez d'uriner dans les toilettes.</p>	
<p>14. Refermez le pot de façon bien étanche.</p> <p>15. Lavez-vous les mains à l'eau et au savon pendant 30 secondes.</p> <p>16. Déposez rapidement (sous les 2 heures) votre flacon bien identifié, avec la prescription médicale associée, au secrétariat du laboratoire ou au soignant qui vous l'a demandé.</p>	

Faut-il prendre des précautions pendant la collecte d'urine ?

Le prélèvement d'urine doit être effectué avant toute prise de médicaments (antibiotiques)